

Pflichttext

Cilodex 3 mg/ml / 1 mg/ml Ohrentropfen, Suspension. Zus.: 1 ml Suspension enth. 3 mg Ciprofloxacin (als Hydrochlorid) u. 1 mg Dexamethason. **Sonst. Bestandt.:** Benzalkoniumchlorid, Hyetellose, Natriumacetat-Trihydrat, Essigsäure (36 %), Natriumchlorid, Natriumedetat (Ph. Eur.), Tyloxapol, Borsäure, Salzsäure (3,6 %) / Natriumhydroxid-Lösung (4 %) (zur pH-Einstellung), ger. Wasser. **Anw.:** Zur Behandl. bei akuter Mittelohrentzündung (Otitis media) bei Pat. mit Paukenröhrchen (AOMT) u. akuter Otitis des äußeren Gehörgangs (Otitis externa, AOE). **Gegenanz.:** Überempfindlichk. gg. Ciprofloxacin, andere Chinolone, Dexamethason od. einen d. sonst. Bestandt. Infektionen d. Ohres durch Viren (z. B. Varizellen, Herpes simplex) u. Pilze. **Warnhinw.:** Ausschließl. für d. Anw. am Ohr bestimmt; nicht zur Anw. am Auge, als Inhalation od. Injektion. **Nebenw.:** verschwommenes Sehen; Candidiasis; Überempfindlichk.; Parästhesie d. Ohren, Weinen, Schwindelgefühl, Kopfschm.; Ohrenschmerz., Otorrhoe, Ohrkongestion, Ohrenbeschw., Ohrenjucken, Pilzinfektion d. Ohres, Hypakusis, Tinnitus, Arzneimittelrückstand; Schwellung d. Ohrmuschel; Hitzegefühl; Erbrechen, Geschmacksstör.; Exfoliation d. Haut, erythematöser Hautauschlag; Obstruktion d. Paukenröhrchens, Reizbark., Ermüdung. **Verschreibungspflichtig.** Stand: 04/2019. InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH, Von-Humboldt-Str. 1, 64646 Heppenheim.