

Pflichttext

InfectoGingi® Mundgel, 10 mg/120 mg/120 mg pro 1 g, Gel zur Anwendung in der Mundhöhle.
Zus.: 1 g Gel enth.; 10 mg Lidocain, 120 mg Auszug aus Salbeiblättern (1:1,95 – 2,2) Auszugsmittel Ethanol 66,3 % (V/V), 120 mg Auszug aus Kamillenblüten (1:1,9 – 2,2) Auszugsmittel Ethanol 66,3 % (V/V), Minzöl, Propylenglycol, Kaliumcarbonat, Kieselsol (Natrium 1430), Hydroxyethylcellulose, Chlorophyllin-Kupfer-Komplex-Trinatriumsalz, ger. Wasser. **Anw.:** Zeitweilige unterstütz. Beh. von Entzündungen u. Wunden der Mundschleimhaut u. des Zahnfleisches. **Gegenanz.:** Überempf. gg. die Wirkst., Minzöl, Korbblütler od. einen der sonst. Bestandteile. **Warnhinw.:** Propylenglykol kann Hautreiz. verursachen. Anw. mit Vorsicht bei Babys unter 4 W., insbes., wenn das Baby gleichz. andere Arzneim. erhält, die Propylenglycol od. Alkohol enthalten. **Nebenw.:** Überempf.-Reakt. wie z. B. Brennen, Schwellungen, Rötungen, Jucken, nesselartiger Hautausschlag (Urtikaria), Hautentzündung (Kontaktdermatitis), Hautausschlag od. Schmerzen mögl.; Geschmacksveränd., Gefühllosigkeit; schw. allerg. Sofortreakt. (anaphylakt. Reakt. u. Schockreakt.). Bei entsprechend sensibilisierten Pat. können durch Minzöl Überempf.-Reakt. (einschließl. Atemnot) ausgelöst werden. **Apothekenpflichtig.** Stand 08/2023. Infectopharm Arzneimittel und Consilium GmbH, Von-Humboldt-Str. 1, 64646 Heppenheim