

Pflichttext

OtoAkut 50 mg/g + 10 mg/g Ohrentropfen, Lösung. Zus.: 1 g Lösung enth. 50 mg Phenazon u. 10 mg Procainhydrochlorid. **Sonst. Bestandt.:** Glycerol (E 422), Butylhydroxyanisol (Ph. Eur.) (E 320). **Anw.:** Zur lokalen symptomat. Therapie v. Schmerzen im äußeren Gehörgang bei äußeren Ohrinfekt. u. akuter Otitis media. Darf nur bei intaktem Trommelfell angewendet werden. **Gegenanz.:** Überempfindlichk. gg. den Wirkst. od. einen der sonst. Bestandteile; Überempfindlichk. gg. Pyrazolone (z. B. Arzneim., die Metamizol, Isopropylaminophenazon, Propyphenazon od. Phenazon enth.) od. gg. Phenylbutazon-haltige Arzneimittel; Trommelfellperforation od. Entzündung des Gehörgangs mit Hautverletzung; best. Stoffwechselerkrankungen (hepat. Porphyrrie, kongenitaler Glucose-6-Phosphatdehydrogenase-Mangel). **Warnhinw.:** Butylhydroxyanisol (Ph. Eur.) (E 320) kann örtl. begrenzt Hautreizungen (z. B. Kontaktdermatitis), Reizungen der Augen u. Schleimhäute hervorrufen. **Nebenw.:** Überempfindlichkeitsreakt. wie Hautreakt. od. Nesselfieber. **Apothekenpflichtig.** Stand: 05/2023. InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH, Von-Humboldt-Str. 1, 64646 Heppenheim