

# Anleitung zur Zubereitung der fertigen Suspension OPPI 2 mg/ml



Der Behälter ist ein Zweikammersystem, welches Pulver sowohl im Deckel als auch in der Flasche enthält und im Aluminiumfolienbeutel versiegelt ist. Eine 5-ml-Dosierspritze, ein Flaschenadapter und ein grauer kindersicherer Schraubdeckel liegen bei.



Den roten Schraubdeckel von der Flasche entfernen. Mit einem geeigneten Messinstrument 64 ml Wasser bis zur Linie auf dem Etikett hinzufügen.

## Vereinigung der Pulver aus Deckel und Flasche



Der erste Schritt besteht darin, die Pulver im Deckel als auch in der Flasche zu kombinieren. Schütteln Sie die Flasche 10 Sekunden lang, um das Pulver sowohl in der Kappe als auch in der Flasche zu lockern.



Den roten Schraubdeckel sicher auf der Flasche befestigen und 30 Sekunden lang kräftig schütteln.



Den roten Schraubdeckel gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis das Siegel bricht und das Pulver aus dem roten Schraubdeckel in die Flasche freigegeben wird. Eine rote Mischscheibe fällt in die Flasche. Sie sollte nicht entfernt werden, da sie beim Mischen der Pulver und der Suspension hilft.



Den roten Schraubdeckel und den roten Ring entfernen und wegwerfen. Den farblosen, transparenten Flaschenadapter einsetzen.



Den roten Schraubdeckel zurück in die ursprüngliche Position drehen und sicher auf der Flasche befestigen.



Die Flasche dann mit dem grauen Schraubverschluss aus Kunststoff fest verschließen.

## Zubereitung des Pulvers



Die Flasche 10 Sekunden lang kräftig schütteln, um die Pulver zu mischen.



OPPI 2mg/ml nun 15 Minuten stehen lassen, damit die endgültige Konsistenz erreicht wird. Nach der Zubereitung enthält die Flasche 90 ml Suspension, wovon 75 ml zur Verabreichung bestimmt sind.



Dreimal mit dem Boden der Flasche auf eine harte, horizontale Oberfläche klopfen, um sicherzustellen, dass sich das gesamte Pulver in der Flasche und nicht im Deckel befindet.